

イナビルには2種類の剤形があります。

### ●イナビル<sup>®</sup>吸入懸濁用160mgセット

ネブライザを用いて口から吸う「吸入型」のインフルエンザのお薬です。  
医師の指示に従い、吸入しましょう。  
\*乳糖は含まれていません。



### ●イナビル<sup>®</sup>吸入粉末剤20mg

口から吸う「吸入型」のインフルエンザのお薬です。  
処方されたらできるだけ早く吸入しましょう。吸入方法の詳細は、「使用説明書」をご覧ください。  
\*乳糖が含まれていますので、アレルギーのために乳製品を制限している人には注意が必要です。



iPhone無料アプリ『イナビル吸入ガイド!』をご利用ください!

➤イナビル吸入粉末剤の吸入操作を疑似体験できます。

App Storeで「イナビル吸入ガイド!」を探して、  
iPhoneに無料でダウンロードいただけます。



iPhoneは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。App StoreはApple Inc.のサービスマークです。

イナビルは、医師から指示された用量を1回分、口から吸うだけで、治療は終了します。  
イナビルは、くつろいだ状態（例えば座った状態）で吸入してください。  
吸入後は、インフルエンザからの回復のために、翌日以降も安静にし、水分補給と十分な睡眠を心がけましょう。



イナビルおよびインフルエンザに関する情報は  
Webサイト『インフル・ニュース』でご覧いただけます!

●PC用webサイト

<https://www.influ-news.info/top.html>

インフル・ニュース 検索

●スマートフォン用webサイト

<https://www.influ-news.info/s/>



医療機関または薬局の連絡先



第一三共株式会社

INA1P01801-0MK

医薬品リスク管理計画  
(RMP)

本資料はRMPの一環として  
位置付けられた資料です  
対象：イナビル吸入懸濁用160mgセット

## イナビル<sup>®</sup>を処方されたみなさま、 保護者のみなさまへ

【監修】日本臨床内科医会 インフルエンザ研究班 リサーチディレクター 池松 秀之 先生  
川崎医科大学 小児科学 教授 中野 貴司 先生

## 異常行動について

インフルエンザにかかった時は、  
飛び降りなどの「異常行動」をおこすおそれがあります。  
(特に発熱から2日間は要注意!)

窓の鍵を確実にかけるなど、異常行動に備えた対策を徹底してください。

〈異常行動による転落等の事故を予防するためのお願い〉

- インフルエンザの患者さんでは、抗インフルエンザウイルス薬の服用の有無や種類にかかわらず、異常行動に関連すると考えられる転落死等が報告されています。
- 異常行動は、
  - ①就学以降の小児・未成年者の男性で報告が多い(女性でも報告がある)
  - ②発熱から2日間以内に発現することが多い ことが知られています。

### 異常行動 の例

- 突然立ち上がって部屋から出ようとする
- 興奮して窓を開けてベランダに出て、飛び降りようとする
- 人に襲われる感覚を覚え、外に走り出す
- 突然笑い出し、階段を駆け上がろうとする
- 自宅から出て外を歩いていて、話しかけても反応しない
- 変なことを言い出し、泣きながら部屋の中を動き回る など

予防策は中面をご覧ください

# 異常行動について (続き)

〈異常行動による転落等の事故を予防するためのお願い〉

● 万が一の転落等の事故を防止するため、発熱から少なくとも2日間は、就寝中を含め、特に小児・未成年者が容易に住居外へ飛び出さないために、例えば、以下のような対策を講じてください。


- 玄関や全ての部屋の窓を確実に施錠する  
(内鍵、チェーンロック、補助鍵が備え付けられている場合は、その活用を含む)
- ベランダに面していない部屋で寝かせる
- 窓に格子のある部屋がある場合は、その部屋で寝かせる
- 一戸建てにお住まいの場合は、できる限り1階で寝かせる




窓を確実に施錠



ベランダに面していない部屋



窓に格子のある部屋



できる限り1階で

# 登校・外出について —学校保健安全法施行規則より—



熱が下がった後は**最低2日間(幼児は3日間)**、かつ、**インフルエンザ発症後からは5日間は自宅で療養しましょう!**

ただし、病状により、医師が「感染のおそれがない」と認めた時は、この限りではありません。

例1 ● インフルエンザが発症してインフルエンザのお薬を服用し、2日目に熱が下がった場合でも…

発症日(0日目) 発症後1日目 発症後2日目 解熱後1日目 解熱後2日目 発症後5日目 登校・外出の目安  
月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日



例2 ● インフルエンザが発症して5日目に熱が下がった場合は…

発症日(0日目) 発症後1日目 発症後2日目 発症後3日目 発症後4日目 発症後5日目 解熱後1日目 解熱後2日目 登校・外出の目安  
月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日



熱が下がっても、しばらくはインフルエンザウイルスが残っているため、**他の人に感染させる可能性があります。**(主治医の先生の指示に従ってください)



▼ 記入例

9月10日(金)

発症後 2 日目

8:20 18:40

(38.0℃) (38.4℃)



強い 弱い なし  
強い 弱い 強い なし

ふらふらした

イナビルを吸入した日

2日目

3日目

4日目

5日目

6日目

発症日 月 日( )	2日目			3日目			4日目			5日目			6日目		
	発症後	日目	日目	発症後	日目	日目	発症後	日目	日目	発症後	日目	日目	発症後	日目	日目
測定時間	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
体温(℃)	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
症状	せき	強い 弱い なし	強い 弱い なし	強い 弱い なし	強い 弱い なし	強い 弱い なし	強い 弱い なし	強い 弱い なし	強い 弱い なし	強い 弱い なし	強い 弱い なし	強い 弱い なし	強い 弱い なし	強い 弱い なし	強い 弱い なし
	身体のだるさ	強い 弱い なし	強い 弱い なし	強い 弱い なし	強い 弱い なし	強い 弱い なし	強い 弱い なし	強い 弱い なし	強い 弱い なし	強い 弱い なし	強い 弱い なし	強い 弱い なし	強い 弱い なし	強い 弱い なし	強い 弱い なし
	その他														

インフルエンザの症状を記録しましょう!