

## くすりのしおり

660443018

2009年3月改訂


薬には効果（ベネフィット）だけでなく副作用（リスク）があります。副作用をなるべく抑え、効果を最大限に引き出すことが大切です。このために、この薬を使用される患者さんの理解と協力が必要です。

### 商品名：リレンザ〔予防用〕

主成分：ザナミビル水和物（Zanamivir hydrate）

剤形：白色の円形ホイルパック入り吸入用散剤

シート記載：Relenza (zanamivir) 5mg、Rotadisk、GlaxoSmithKline



### この薬の作用と効果について

A型またはB型インフルエンザウイルスの表面に存在する酵素を阻害して、ウイルスが感染細胞から遊離したり、気道の上皮細胞に接近するのを防ぎます。

通常、A型またはB型インフルエンザウイルス感染症の予防に用いられます。

### 次のような方は使う前に必ず担当の医師と薬剤師に伝えてください。

- ・ 以前に薬を使用して、かゆみ、発疹などのアレルギー症状が出たことがある。
- ・ 妊娠または授乳中
- ・ 他に薬を使っている（お互いに作用を強めたり、弱めたりする可能性もありますので、大衆薬も含めて他に使用中の医薬品に注意してください）。

### 用法・用量（この薬の使い方）

- ・ **あなたの用法・用量は** ：医療担当者記入
- ・ 通常、成人および小児は1回2プリスター（ザナミビルとして10mg）を1日1回10日間、専用の吸入器を用いて吸入します。必ず指示された使用方法に従ってください。
- ・ 専用吸入器（ディスクヘラー）を用い、口腔内吸入にのみ使用し、使用説明書（リレンザの吸入法）に書かれている「薬の装着方法、吸入方法」をよく読んで使用してください。吸入はくつろいだ姿勢（座った状態など）で行ってください。
- ・ 指示された時間に使用するのを忘れた場合は、気がついた時点で1回分（2プリスター）を吸入してください。ただし、次に使用する時間が近い場合は次の1回分を抜いてください。絶対に2回分を一度に吸入してはいけません。
- ・ 誤って多く吸入した場合は医師または薬剤師に相談してください。
- ・ 医師の指示なしに、自分の判断で吸入するのを止めないでください。

### 生活上の注意

### この薬を使ったあと気をつけていただくこと（副作用）

主な副作用として、下痢、発疹、吐き気、嘔吐、嗅覚障害などが報告されています。このような症状に気づいたら、担当の医師または薬剤師に相談してください。

まれに下記のような症状があらわれ、[ ]内に示した副作用の初期症状である可能性があります。

このような場合には、使用をやめて、すぐに医師の診療を受けてください。

- ・ 口腔咽頭浮腫（口の中や喉の腫れ）、動悸、じんましん〔アナフィラキシー様症状〕
- ・ 突然の息切れ、喘鳴（ヒューヒュー音）、呼吸しにくい〔気管支攣縮、呼吸困難〕

以上の副作用はすべてを記載したものではありません。上記以外でも気になる症状が出た場合は、医師または薬剤師に相談してください。

### 保管方法その他

- ・ 乳幼児、小児の手の届かないところで、直射日光、高温、湿気を避けて保管してください。
- ・ 薬が残った場合、保管しないで廃棄してください。

医療担当者記入欄 年 月 日

より詳細な情報を望まれる場合は、担当の医師または薬剤師におたずねください。また、「患者向医薬品ガイド」、医療専門家向けの「添付文書情報」が医薬品医療機器総合機構のホームページに掲載されています。